

CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS



Castilla-La Mancha

TERMOESTABILIDAD DE LAS VACUNAS DE USO FRECUENTE

VACUNA	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO					OBSERVACIONES
	2-8 °C	22-25 °C	35-37 °C	>37 °C		
Polio Inactivada	Estable durante 1-4 años.	Descenso de la capacidad del antígeno D para el tipo 1 al cabo de 20 días.	Pérdida total del antígeno D para el tipo 1 tras 20 días.			No debe congelarse. Proteger de la luz.
Difteria, Tétanos, Tos Ferina (DTaP/dTap)	Almacenamiento satisfactorio durante 18-24 meses, aunque con disminución de su potencia.	Estabilidad variable. Algunas vacunas permanecen estables durante dos semanas.	Estabilidad variable. Algunas vacunas pierden el 50% de actividad después de 1 semana.	A 45 °C pérdida del 10% de potencia por día. A 50 °C pérdida rápida de actividad.		No debe congelarse.
Sarampión, Rubéola, Parotiditis	Estable 18-24 meses.	Mantiene una actividad satisfactoria durante 1 mes.	Mantiene una potencia satisfactoria durante una semana.	50% de pérdida de actividad después de 2-3 días de exposición a 40 °C.		El liofilizado puede congelarse, el disolvente no. Una vez reconstituida debe administrarse inmediatamente. Proteger de la luz.
Toxoido Tetánico y Diftérico (Td)	Estable durante 3-7 años.	Estable durante meses.	Estable por lo menos durante 6 semanas.	A 45 °C estable durante 2 semanas. A 53 °C pérdida de actividad después de pocos días.		No debe congelarse.
Hepatitis B	Estable durante 4 años.	Estable durante meses.	Estable durante meses.	A 45 °C estable durante 3 días.		No debe congelarse.
Hepatitis A	Estable durante 2-3 años.	Estable durante 15 días.	Estable durante 1 semana.			No debe congelarse.
Gripe	Válida sólo para el año que se ha preparado.		No debe superar nunca los 20 °C.			No debe congelarse. Proteger de la luz.
Varicela	Estable durante 2 años.	Estable durante 1 semana.	Inestable.	Inestable.		Debe protegerse de la luz. Una vez reconstituida debe administrarse inmediatamente.
Meningitis C	Estable durante 3 años y medio.	Estable durante 9 meses a temperatura inferior a 25°C.	Estable durante 30 días a temperatura inferior a 40 °C.			No debe congelarse ni permanecer a menos de 2 °C. Proteger de la luz.
VPH		Estable durante 30 días a 35 °C.		Estable durante 7 días a 35 °C.		No debe congelarse.