

Iniciativas a fomentar

Combinar medidas de prevención

Es recomendable integrar varios tipos de medidas para multiplicar su eficacia. Los costes también pueden verse reducidos al combinarlas.



Grupos de coordinación

La coordinación entre agrupaciones de agricultores y sociedades de cazadores de la misma comarca y entidad local correspondiente.

Asegura tus cultivos

Adicionalmente a estas medidas preventivas, las explotaciones agrícolas pueden protegerse a través del Seguro Agrario para hacer frente a los daños causados por la fauna.



Involucrar a las Administraciones competentes

Las Administraciones competentes deberían poner en marcha instrumentos o herramientas que faciliten la implantación de las medidas de prevención, como por ejemplo a través de medidas agroambientales o facilitación de los permisos oportunos para su implantación.



MÁS INFORMACIÓN:

Para obtener más información y datos actualizados acerca de las medidas probadas, así como de su efectividad y rentabilidad para reducir los daños de conejo en la agricultura, podéis consultar nuestra web: Preveco.es



Cofinanciado por la Unión Europea al 80% Inversión total: 546.952,06 €
Autoridad encargada de la gestión de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional: DGDRIFA

PREVECO

Prevención de daños del conejo

Grupo Operativo PreveCo

Prevención de daños en la agricultura producidos por el conejo en Castilla-La Mancha y Extremadura



Cofinanciado por la Unión Europea al 80% Inversión total: 546.952,06 €
Autoridad encargada de la gestión de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional: DGDRIFA


Este Grupo Operativo está integrado por WWF, UPA, FOMECAM y la Fundación CBD-Hábitat, y como miembros colaboradores a la D. G. de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Castilla-La Mancha, la D. G. de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y AGROSEGURO.

El Grupo Operativo PreveCo nació ante el fenómeno de los daños producidos por el conejo que están afectando gravemente y de forma generalizada a diversas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Navarra, Madrid, Cataluña, Valencia y La Rioja. Tanto es así que, según los datos de siniestralidad de AGROSEGURO, el conejo es la especie silvestre que genera una mayor siniestralidad, representando más del 40% de los pagos y afectando a una superficie media de 41.000 hectáreas anuales. El Grupo Operativo PreveCo se está desarrollando con el objetivo de reducir las pérdidas económicas causadas por daños por conejo en las explotaciones agrícolas, gracias a la aplicación de medidas preventivas.

Las medidas que se han probado en el Grupo Operativo para reducir los daños del conejo en las explotaciones agrícolas son algunos sistemas tradicionales que han caído en desuso, que irán acompañados de otra serie de medidas novedosas.


VALLADO PERIMETRAL

Instalación de malla conejera (triple torsión) alrededor de todo el cultivo o bien entre este y la zona de presencia de conejos. Malla de 1 metro de altura total. Se entierran 40 cm con objeto de dificultar el acceso por galerías inferiores excavadas por los conejos. Montaje justo después de la siembra.



Eficacia ●●●●●

Coste/beneficio ●●●●●●



VALLADO CON PASTOR ELÉCTRICO

Instalación de malla conejera protegiendo el cultivo tal como se describe en la medida nº 1. En la zona externa de este vallado se instala un pastor eléctrico separado de la malla conejera unos 30 cm. El pastor eléctrico está formado por hilos metálicos o cintas


que conducen electricidad (de gran voltaje y bajo amperaje). La malla conejera se monta justo después de la siembra, mientras que el pastor eléctrico cuando esta comience a crecer.

Eficacia ●●●●●

Coste/beneficio ●●●●●●

FOSO PERIMETRAL

Foso de unos 25-40 cm de profundidad y entre 50-75 cm de ancho cubierto con malla de triple torsión. Los conejos no acceden a la siembra. Instalación justo después de la siembra.



Eficacia ●●●●●

Coste/beneficio ●●●●●●

AHUYENTADORES CON SONIDOS Y ULTRASONIDOS

Instalación en el interior de la parcela de dispositivos que emitan sonidos y/o ultrasonidos. Se pueden emplear dispositivos colocados cada 8-10 metros (según la sensibilidad del aparato y de las recomendaciones del fabricante), rodeando la superficie a proteger, con grabaciones de disparos o de sonidos de depredadores (perros, zorros, rapaces...). También se pueden emplear dispositivos que emiten ultrasonidos a cierta frecuencia que ahuyentarán a los conejos. Instalar después de la siembra.



Eficacia ●●●●●

Coste/beneficio ●●●●●●

ADAPTACIÓN DE CULTIVOS

Mantener una banda alrededor de la zona cultivada, en concreto en las partes más cercanas al borde por donde van a entrar los conejos, sembrada con leguminosas u otras especies palatables para el conejo, que las seleccionará frente al cultivo, mitigando considerablemente los daños en el mismo.




En el caso de la lavanda, se siembra igualmente en el perímetro del cultivo, con una distancia entre plantas de 25-30 cm, para dificultar el acceso al mismo por parte de los conejos. Podría funcionar como barrera química por la emisión de sustancias olorosas que producen rechazo o aversión a los conejos.

Bandas de lavanda o alberjones
Eficacia ●●●●● Coste/beneficio ●●●●●●

Bandas de centeno
Eficacia ●●●●● Coste/beneficio ●●●●●●

POSADEROS PARA RAPACES

Instalación de posaderos artificiales para rapaces. Se puede también conservar y mejorar los árboles de las explotaciones agrícolas como posaderos para ciertas rapaces. Los posaderos artificiales se instalarán, si es posible, en las proximidades y encima de los vivares naturales de los conejos para mejorar su eficacia, sobre todo en parcelas alejadas de posaderos naturales para las aves rapaces.



Eficacia ●●●●●

Coste/beneficio ●●●●●●



Eficacia ●●●●●

Coste/beneficio ●●●●●●

INHIBIDOR DE LA ATRACCIÓN DE LOS CONEJOS AL CULTIVO

El inhibidor de la atracción de los conejos al cultivo TOPTEN® es una solución a base de EDTA zinc. Este abono corrige carencias en cultivos deficientes en este microelemento al tiempo que su aplicación evita la atracción sobre el cultivo.



HURONEO

En los vivares se tapan todas las bocas, donde se colocan las redes o “capillos” y se introducen hurones (*Mustela furo*) para que los conejos huyan y queden atrapados en las redes.

Eficacia ●●●●●

Coste/beneficio ●●●●●●